



MANUAL DE RECONOCIMIENTO DE FAUNA

DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO



**SALVEMOS
VIDAS**
JUNT@S



FUNDACIÓN
ACCIÓN FAUNA
CONSERVACIÓN DE FAUNA NATIVA

MANUAL DE RECONOCIMIENTO DE FAUNA DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

PRIMERA EDICIÓN: 2024

Edición General: Fundación Acción Fauna,
Cajón del Maipo, Chile.

www.accionfauna.org

Contacto: contacto@accionfauna.org

ISBN: 978-956-08044-0-2

Edición: Kendra Ivelic, María Jesús Ramírez

Investigación: Antonia Pérez

Diseño General: Alonso Fuentes Castillo (AFFC EIRL)

Ilustraciones: Thalia Wolff R.

El desarrollo de este Manual Educativo de Fauna Nativa de la Región Metropolitana de Santiago, es parte del Proyecto "Salvemos Vidas Juntos" del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDP, aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por Fundación Acción Fauna con el apoyo integral del Refugio Animal Cascada.

Ninguna parte de este libro, sus textos e ilustraciones, podrá ser reproducida, transmitida o almacenada sea por ningún procedimiento óptico, electrónico, químico, fotocopias o cualquier otro tipo, sin permiso escrito de la Fundación Acción Fauna.

Prohibida la publicación de textos, ilustraciones, fotografías, esquemas y más a través de Internet.


La edición y circulación de los esquemas utilizados como mapas en esta publicación u otros impresos que se refieran o relacionen con los límites y fronteras de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile; de acuerdo con el artículo 2° Letra g del DFL N°83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Escanea este código para
revisar las fuentes oficiales
de información de este
manual y seguir aprendiendo
sobre la fauna nativa.



¿CÓMO LEER ESTA GUÍA?



- 1 NOMBRE COMÚN
- 2 NOMBRE EN INGLÉS
- 3 NOMBRE CIENTÍFICO
- 4 NOMBRE EN MAPUDUNGÚN
- 5 NOMBRE EN AYMARA
- 6 MAPA DE DISTRIBUCIÓN
- 7 INFORMACIÓN
- 8 ILUSTRACIÓN
- 9 AMENAZAS
- 10 ORIGEN
- 11 ESTADO DE CONSERVACIÓN
- 12 DIETA
- 13 ACTIVIDAD
- 14 PESO
- 15 TAMAÑO

GLOSARIO

DIMORFISMO SEXUAL:

Existencia de diferencias físicas entre el macho y la hembra de una misma especie animal.

ECOSISTEMA:

Sistema natural formado por la interacción entre los seres vivos y su entorno físico, incluyendo factores abióticos como el suelo, el clima y el agua.

ESCLERÓFILO:

Tipo de planta adaptada a entornos áridos o semiáridos, caracterizada por tener hojas duras y coriáceas que reducen la pérdida de agua.

CADUCIFOLIO:

Tipo de planta que pierde sus hojas durante una parte del año, como una adaptación para conservar energía y agua.

SIMBOLOGÍA

ORIGEN



ENDÉMICO

La distribución de una especie es limitada a una área geográfica reducida y no existe de forma natural en ningún otro lugar del mundo.



NATIVO

Especie originaria de una región geográfica.



INTRODUCIDO

Especie que ha sido introducida por el ser humano a un área geográfica donde no es originaria.

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN:

Basadas en categorización del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y en UICN:



EXTINTO



EXTINTO
EN ESTADO
SILVESTRE



PELIGRO
CRÍTICO



EN
PELIGRO



VULNERABLE



CASI
AMENAZADA



PREOCUPACIÓN
MENOR

DIETA



CARROÑERO



CARNÍVORO



HERBÍVORO



OMNÍVORO



FUNGÍVORO



INSECTÍVORO

ACTIVIDAD



DIURNO



NOCTURNO



CREPUSCULAR



VARIADA

NOMBRES

MAPUDUNGÚN

M

Filu

AYMARÁ

A


Asiru

DIMORFISMO SEXUAL



Macho
Hembra


¿ENCONTRASTE A UN ANIMAL SILVESTRE?




REDES TRÓFICAS

En la naturaleza los organismos no están aislados: interactúan entre ellos y con el entorno. Necesitan energía y materia para mantener la vida y, según cómo las obtienen, se clasifican en niveles tróficos.

Los niveles tróficos se unen entre sí por cadenas alimentarias que permiten el movimiento de energía desde los productores primarios a los diferentes organismos consumidores, creando una red trófica de interacciones.



RED TRÓFICA EN CHILE CENTRAL



La cadena trófica del ecosistema de Chile central ha sufrido modificaciones por la casi extinción local del guanaco, generando un desbalance severo en las diversas interacciones.

Cada especie cumple una función dentro del ecosistema y una alteración en estas redes puede provocar una cascada de complejidades.

CHILE MEDITERRÁNEO



Chile continental es considerado una isla biogeográfica, debido a que se encuentra rodeado de barreras naturales que evitan el contacto directo con otras zonas; por el norte el gigante y árido desierto de Atacama, por el este la gran cordillera de los Andes, por el oeste el vasto océano Pacífico y por el sur los impenetrables campos de hielo. Esto ha generado un alto nivel de endemismo de especies, es decir, en Chile muchas especies no existen de manera natural en ninguna otra parte del mundo.

Chile central

es una de las 5 regiones del planeta con clima mediterráneo, que se caracteriza por un invierno frío y húmedo, y un prolongado verano cálido y seco.



Clima mediterráneo en el Mundo

Especies presentes en Chile mediterráneo



Más de un 50% de la flora de este ecosistema son endémicas de Chile y alrededor de un 30% están exclusivamente en la Región Metropolitana.



200 especies de aves aprox., 7 especies endémicas



37 especies de mamíferos aprox., 50% endémicos.



37 especies de reptiles aprox. 50% endémicos.



12 especies de anfibios aprox. 25% endémicos.

60%

de la población humana vive en esta zona, generando una constante modificación del paisaje y en consecuencia, una creciente amenaza para las especies que ahí habitan.

Este ecosistema se considera un "punto caliente" de biodiversidad, pues es un sitio que alberga un alto porcentaje de especies endémicas y tienen tasas aceleradas de destrucción de hábitat. Comparte la categoría con otras 35 regiones a nivel global.

¿DÓNDE ENCONTRARLOS?

Muchos de los animales que conocerás en
este manual viven alrededor tuyo.
¡Son tus vecinos!



En todas las plazas y cerros de la ciudad de
Santiago puedes conocer a la fauna con la
que cohabitamos a diario.




FAUNA

Los animales pertenecen al reino Animalia, una de las grandes subdivisiones de los organismos vivos. Dentro de él se agrupa una gran diversidad de especies con tamaños, formas, colores y características de vida muy variadas. Los mamíferos, reptiles, aves, anfibios e insectos son algunos de ellos.

Se denomina fauna al conjunto de animales de un lugar determinado.

REPTILES

A large, light green silhouette of a lizard is positioned on the right side of the page, facing left. It has a long tail that curves downwards and a head with visible eyes and a mouth. The silhouette is semi-transparent, allowing the background to show through it.

CARACTERÍSTICAS DE LOS REPTILES:

Los reptiles están cubiertos de escamas; estructuras compuestas principalmente de queratina, que dan protección contra la deshidratación y los depredadores.

La mayoría de los reptiles tienen reproducción ovípara, es decir, ponen huevos con cáscaras duras que protegen al embrión en desarrollo del ambiente externo.

Son animales ectotermos, es decir, dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal. Pasan tiempo al sol para calentarse y buscan sombra o refugio para enfriarse.

Cuando un reptil crece de tamaño debe “mudar” y producir una nueva piel.

En la zona central se encuentra el
39% de los reptiles de Chile.

CULEBRA DE COLA LARGA

LONG-TAILED SNAKE, CHILEAN GREEN RACER

Philodryas chamissonis

M *Filu*

A *Asiru*

¿Dónde habita?

Vive en lugares secos, bajo rocas y matorrales.

Reproducción

Ovípara, la postura es de entre 6 y más de 10 huevos alargados. El tiempo de incubación es de aproximadamente 60 días.

¿Qué come?

Se alimenta de roedores, aves, otros reptiles y anfibios, muchas veces usando la constricción para matar presas.

¿Sabías que?


El veneno podría producir alergia. Los accidentes por mordeduras a humanos son poco frecuentes y ocurren en defensa propia.

Tiene colmillos con veneno en la parte posterior de la mandíbula (dentición opistoglifa), siendo muy difícil inyectar a su presa.



⚠ Principales amenazas:

- Caza furtiva por ser considerada como peligrosa para los humanos.
- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Mortalidad accidental por atropello en carreteras.
- Pérdida y/o degradación del hábitat.



LAGARTIJA ESBELTA

THINTREE LIZARD

Liolaemus tenuis

M Fillkuñ (lagartija)

A Sut'uwaylla (lagartija)



¿Dónde habita?

Vive en bosques, ambientes de matorral y sobre rocas. Frecuenta también construcciones humanas.

Reproducción

Ovípara, pone alrededor de 6 huevos en diversos lugares y luego la hembra se va, sin tener cuidado parental. El macho es muy territorial y forma un grupo con muchas hembras.

¿Qué come?

Se alimenta de insectos, principalmente coleópteros y dípteros.



Macho: tonos coloridos.
Hembra: coloración tenue.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat.
- Ataques de gatos domésticos.



5 - 10 g



IGUANA CHILENA

CHILEAN RACERUNNER

Callopiastes maculatus

M *Kirke waka*

A



¿Dónde habita?

Vive en zonas con matorrales, cactáceas, sectores rocosos y arenales.

Reproducción

En época reproductiva el macho persigue a la hembra y usa sus mandíbulas para atraparla por el cuello. Es ovípara y pone hasta 12 huevos.

Es el lagarto más grande de Chile.
Puede trepar arbustos para cazar aves en sus nidos.



¿Qué come?

Insectos, pequeños mamíferos y reptiles, aves y en menor medida carroña y ejemplares de la misma especie. Algunas poblaciones que viven en zonas de mayor altitud complementan su dieta consumiendo frutos silvestres.




Macho: coloración naranja en el cuello.
Hembra: más pequeña.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat.
- Captura y tráfico ilegal.
- Depredación por parte de especies domésticas (gatos).



31 - 37 g



Anfibios

El nombre "anfibio" significa "doble vida", pues son animales vertebrados que tienen la capacidad de vivir tanto en el agua como en la tierra.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANFIBIOS:

Respiran a través de su piel húmeda y permeable, incluso bajo el agua.

Muchos anfibios experimentan un proceso llamado **metamorfosis**, en el que pasan por diferentes etapas de desarrollo, como renacuajos en el agua y adultos terrestres.

La mayoría dependen del agua para reproducirse y mantener su piel húmeda.

Durante el invierno, muchas especies hibernan en lugares protegidos para sobrevivir a las temperaturas frías.

En época de reproducción los anfibios suelen tener cantos o vocalizaciones muy característicos, principalmente durante el crepúsculo y en la noche.

Son animales ectotermos, lo que significa que dependen de fuentes externas de calor para regular su temperatura corporal.

En Chile existen **63** especies de anfibios, de las cuales un **60%** son endémicas. En la zona central se puede encontrar un **15%** de las especies del país.

SAPO DE RULO

CONCEPCION TOAD

Rhinella arunco

M *Pakarwa*

A *Jamp'atu*

¿Dónde habita?

Vive principalmente en quebradas secas de la zona central, con cursos de agua temporales. Se refugia bajo piedras durante el día y se aventura a recorrer durante la noche.

Reproducción

Para reproducirse las hembras depositan en el agua un largo "cordón de huevos" que puede llegar a medir 13m de largo y contiene entre 1.000 y 2.000 huevos.

¿Qué come?

Invertebrados pequeños.

El término arunco deriva del mapudungún arüinko, un ser mitológico con forma de sapo que cuida la pureza y la conservación de las aguas.



⚠ Principales amenazas:

- La pérdida y/o degradación del hábitat.
- Contaminación por el uso de agrotóxicos.
- Disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas.
- Incendios forestales.



Insectos

Son el grupo más diverso y numeroso del reino animal, con más de un millón de especies descritas y una estimación de millones más aún por descubrir.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSECTOS:

Cuerpo dividido en tres segmentos principales: cabeza, tórax y abdomen.

Los insectos adultos tienen seis patas.

Tienen un exoesqueleto quitinoso que recubre su cuerpo y proporciona soporte estructural y protección.

A través de su papel crucial como polinizadores, descomponedores, depredadores y presas, los insectos desempeñan funciones vitales en los ecosistemas, influenciando directamente la salud de los ecosistemas y la vida en la Tierra en general.



MARIPOSA DEL CHAGUAL

Castnia eudesmia

M *Llampudkeñ*

A *Pilpintu (mariposa)*



¿Dónde habita?

Depende de la presencia de dos bromelias del género *Puya*, conocidas como chaguales, que se distribuyen en laderas rocosas.

Reproducción

En verano la hembra pone 8 a 10 huevos en la base de las hojas del chagual, junto al tallo. Después de 6 a 10 días eclosionan las larvas, las que maduran en un período de entre 1 a 2 años. Las larvas construyen sus capullos con diferentes partes de la planta y permanecen en estado de pupa alrededor de 1 mes.




¿Qué come?

Las larvas se alimentan del tallo de la flor del chagual, mientras que los adultos del néctar de sus flores.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat, debido a que los chaguales están siendo eliminados por plantaciones frutales, construcción de proyectos y/o viviendas y consumo humano.



90 - 115 mm

AVISPA PEPSIS

SPIDER WASP, SPIDER-HUNTING WASP

Pepsis limbata

M

-

A

-


¿Dónde habita?

Principalmente en zonas con vegetación esclerófila abierta, evitando áreas boscosas.



Reproducción

Junto con el verano empieza la época reproductiva. Cada hembra busca una araña de gran tamaño a la cual picar y dejar paralizada. Una vez inmóvil la arrastra a su nido y sobre ella pone los huevos, por lo que sirve de alimento para las futuras larvas.



¿Qué come?

Los adultos se alimentan de néctar, por lo que son polinizadores, visitando principalmente flores blancas, entre ellas las del género *Baccharis*.

⚠ Principales amenazas:

- La pérdida y/o degradación de su hábitat.



ABEJA CAUPOLICANA

CAUPOLICANA DE COLLAR ROJO

Caupolicana fulvicollis

M *Diwali (abeja)*

A *Mamuraya (abeja)*



¿Dónde habita?

Vive en ecosistemas costeros con dunas de arena.

Reproducción

Las hembras cavan túneles en paredones de arena compactada, donde colocan sus huevos y luego tapan la entrada con arena.

¿Qué come?

Néctar de flores, principalmente nativas pero también exóticas.



Es un polinizador de la flora nativa.



Machos y hembras tienen diferencias en el tamaño, morfología y coloración.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- El turismo y las actividades recreativas sobre las dunas (el uso de motos, cuatrimotos y vehículos).
- Los parásitos que introdujeron especies exóticas como la abeja melífera (*Apis melífera*) y el abejorro europeo (*Bombus terrestris*).



Arácnidos

Los arácnidos son un grupo diverso de artrópodos, diferentes a los insectos, con aproximadamente 100,000 especies conocidas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ARÁCNIDOS

Tienen una estructura en forma de pinza llamada quelíceros, que utilizan para manipular alimentos y en algunos casos, como en el caso de las arañas, para inyectar veneno en sus presas.

Cuerpo dividido
en dos segmentos

Tienen ocho patas

Aunque muchas personas sienten temor hacia los arácnidos, estos animales desempeñan roles importantes en los ecosistemas como depredadores de insectos y otros artrópodos, contribuyendo así al equilibrio natural.

ARAÑA POLLITO

CHILEAN ROSE TARANTULA

Grammostola rosea

M *Kula kula* (araña peluda)

A *Kusikusi* (araña)



¿Dónde habita?

Vive asociada al bosque esclerófilo con parches de espino. Construye madrigueras de hasta 45 cm de profundidad.

¿Cuánto vive?

Se tiene el registro que un ejemplar vivió 8,5 años en cautiverio.

Reproducción

Se ha observado en laboratorio la oviposición de huevos 6 meses después de la cópula y que las crías emergieron 60 días después. En promedio se han contado alrededor de 250 crías.



¿Qué come?


Se alimenta de otros artrópodos, como grillos y escarabajos.

¿Sabías que?

Es depredada por avispas, arañas, lagartijas y aves. Presenta diferentes patrones de coloración que van desde el rojizo al café oscuro.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat por causas antrópicas.
- Captura y tráfico ilegal para mascotas.




Mamíferos

Son un grupo de animales caracterizados por ser endotermos (regulan internamente su propia temperatura corporal), alimentar a sus crías con leche materna y tener el cuerpo cubierto de pelos (que permite el camuflaje, protección y ayuda a mantener la temperatura).

Dientes

La mayor parte de los mamíferos tienen 4 tipos de dientes. Los **incisivos** están diseñados para cortar, los **caninos** son puntiagudos y se utilizan para desgarrar, y los **premolares** y **molares** que son planos y sirven para aplastar el alimento. Sin embargo, según el tipo de alimentación se pueden observar particularidades.



Carnívoro:
(ej: puma)




Herbívoro:
(ej: guanaco)



Omnívoro:
(ej: zorro)

Patas


Viven en ambientes muy variados, lo que ha derivado en adaptaciones específicas para los diferentes requerimientos de vida: algunos vuelan, otros pasan su vida en el océano y un porcentaje importante permanece en tierra. Dentro de este último grupo han surgido diferencias en la parte de la extremidad que apoyan para desplazarse:



Patas digitígradas.
Camina sobre los dedos,
como el puma o zorro.



Patas plantígradas.
Camina sobre toda la planta del pie,
incluyendo los metatarsos y
los dedos, como los humanos.



Patas ungulígradas.
Camina sobre la uña, casco o almohadillas.
Estas patas tienen dedos reducidos o fusionados,
como el guanaco o el huemul.

GATO ANDINO

ANDEAN CAT

Leopardus jacobita

M

-

A

Titi, titimisi, titipbisi

¿Dónde habita?

Zonas áridas, con temperaturas extremas, escasa vegetación, con parches rocosos y con presencia de fuentes de agua.

Reproducción

Se sabe muy poco sobre esta especie. Se ha observado que tiene una cría por temporada.

¿Qué come?

Se alimenta de roedores (principalmente de vizcachas (*Lagidium spp.*)), aves, huevos y reptiles.


¿Sabías que?

Es uno de los felinos más amenazado y a la vez menos conocido a nivel mundial.

En la cosmovisión de los pueblos andinos es considerado un animal sagrado, protector y símbolo de fertilidad. Está ligado a los espíritus de la montaña.


Es muy difícil de ver por lo que se estudia principalmente con el uso de cámaras trampa.

Su cola tiene entre 6 a 9 anillos gruesos de color café oscuro o negro y puede medir el 75% de la longitud su cuerpo.



⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- La disminución de su presa principal, la vizcacha.
- Caza ilegal (por conflicto con ganado y para usos tradicionales).
- Depredación y transmisión de enfermedades por parte de especies domésticas (perros).



ZORRO CULPEO

CULPEO FOX

Lycalopex culpaeus

M *Culpem, külpew*

A *Khamake*

¿Dónde habita?

En territorios variados de todo el país, con diferentes climas.

¿Cuánto vive?

Se estima que vive 11 años en vida silvestre.

Reproducción

La camada es de 3 a 5 cachorros criados por la madre y el período de gestación es de 65 días.

¿Qué come?


Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos como roedores, liebres, vizcachas y conejos, aunque también consume huevos, aves y frutos silvestres.

Dispersa semillas del bosque a través de sus heces.

Es el cánido de mayor tamaño en Chile.

⚠ Principales amenazas:

- Ataques y enfermedades de perros.
- La caza furtiva.
- Envenenamiento.
- Atropellos.
- Alimentación por humanos (habituación y posterior desnutrición).



VIZCACHA

MOUNTAIN VISCACHA

Lagidium viscacia

M Truwi

A Wisk'acha



¿Dónde habita?

En agujeros entre rocas y grietas, en terrenos escarpados y rocosos, siendo un gran escalador.

¿Sabías que?

Se parece a un conejo, pero en realidad es un roedor

¿Cuánto vive?

Hasta 19 años en cautiverio.

Reproducción

Tiene 1 cría por parto y la gestación dura 2 meses.

¿Qué come?

Se alimenta de plantas y raíces.




⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y degradación del hábitat.
- Caza furtiva por su carne y la piel.



0,75 - 2kg



YACA

ELEGANT FAT-TAILED MOUSE OPOSSUM

Thylamys elegans

M *Kuya*

A -



¿Dónde habita?

Matorral esclerófilo y vegetación boscosa, principalmente se mueve por los árboles.

Durante el invierno entra en estado de sopor, disminuyendo su actividad y durmiendo gran parte de ésta época.

Reproducción

Es un marsupial, es decir, las crías nacen en estado de gestación poco avanzada.

El período de incubación es de entre 12 y 13 días. Las crías, al nacer, se adhieren a las mamas de la hembra para terminar su desarrollo.

¿Qué come?

Se alimenta principalmente de insectos y en menor medida de huevos, semillas, frutos silvestres y reptiles.

La cola almacena grasa como fuente de alimento, que le permite sobrevivir en la época fría.

Tiene una dentadura aserrada y afilada.

Su cola prensil y las extremidades posteriores con pulgar oponible le facilita trepar.

¿Sabías que?

No es un roedor, es un marsupial

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).



RATÓN OLIVÁCEO

OLIVE GRASS MOUSE, OLIVACEUS FIELD MOUSE

Abrothrix olivacea

M *Dewü* (ratón)

A *Achaku* (ratón)



¿Dónde habita?

Vive en diversos ambientes, desde zonas de pastizal y matorral hasta bosque y matorral húmedo. Habita debajo de troncos o en cuevas construidas por otros animales.

¿Cuánto vive?

En promedio 1 año y 2 meses.

Reproducción

Construye galerías simples donde se reproduce. Generalmente produce 3 camadas de 4 a 6 crías cada una.

Es depredado por aves como la lechuza (*Tyto alba*) y el pequéen (*Athene cunicularia*), y el zorro chilla (*Lycalopex griseus*).

¿Qué come?

Diversos alimentos, como semillas, frutos, hongos e insectos. En la costa consume algas e invertebrados marinos.



⚠ Principales amenazas:

- Veneno de ratón.
- Depredación por parte de especies domésticas (gatos).



PUMA

MOUNTAIN LION

Puma concolor

M ♂ *Trapial* ♀ *pangui* © *pangküll*

A *Titi*

Mamífero terrestre
con mayor distribución
de América

Su rol de depredador es vital para la salud del ecosistema

¿Dónde habita?

Es un animal muy adaptable, habitando en la cordillera, bosque, estepa, matorral y pampa.

¿Cuánto vive?

Entre 9 a 12 años en vida silvestre. Hasta 23 años en cautiverio.

Reproducción

Gestación de 3 meses aproximadamente. Tiene entre 2 a 4 crías que nacen con manchas que luego desaparecen.

¿Qué come?

Es un generalista que se alimenta de diversas presas dependiendo del lugar que habita. Consume principalmente mamíferos, además de aves y a veces reptiles.

¿Sabías que?


Es el depredador terrestre y felino más grande de Chile

⚠ Principales amenazas:

- La pérdida y/o degradación de su hábitat.
- La caza ilegal (por conflicto con ganado).
- La disminución de su presa principal, el guanaco.



Entre 40
y 100 kg



165 -270 cm

GUANACO

GUANACO

Lama guanicoe

M *Lwan*
A *Wanaku*



¿Dónde habita?

Utiliza ambientes diversos como zonas desérticas, semi áridas, montañosas y de estepa, además de bosques abiertos entre los 0 - 4.200 m s.n.m.

¿Cuánto vive?

Hasta 28 años en cautiverio.

Reproducción

La gestación dura 11 meses y nace 1 cría en verano.

¿Qué come?

Su dieta es variada e incluye hierbas, helechos, arbustos, árboles, hongos y cactáceas.

Especie social

Vive en grupos familiares formados por: 1 macho, varias hembras y sus crías; varios machos solteros; o machos solitarios de edad avanzada.

El territorio lo defienden los machos y lo marcan con defecaderos comunales.

Su principal depredador natural es el puma y luego el zorro culpeo, siendo una especie clave en la cadena alimenticia.




Es un dispersor de semillas, contribuyendo a la regeneración de los ecosistemas.

¿Sabías que?

Es el mamífero terrestre de mayor tamaño que habita en Chile

⚠ Principales amenazas:

- La pérdida y/o degradación de su hábitat.
- La caza ilegal.
- Ataques de perros.
- Enfermedades que les traspasa el ganado .
- Cercos ganaderos donde quedan enredados.



QUIQUE

LESSER GRISON

Galictis cuja

M *Kiki, Ilaka*

A



¿Dónde habita?

Preferentemente en lugares rocosos cercanos a cursos de agua y bosque nativo. Más común en ambientes cordilleranos.

¿Cuánto vive?

Hasta 11 años en cautiverio.

Reproducción

Construye madrigueras donde nacen entre 2 a 5 crías. La gestación dura 2 meses aproximadamente.

¿Qué come?

Se alimenta de pequeños mamíferos (roedores y liebres), reptiles, anfibios, aves y huevos.

¿Sabías que?

Se lo puede observar en pequeños grupos familiares trasladándose en fila, uno detrás del otro.

A veces habita en lugares con presencia humana, usando los cimientos de construcciones para construir sus madrigueras.



Es un muy buen cavador, construye galerías de hasta 4 m.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- La caza ilegal por conflicto con aves de corral.
- Atropellos.
- Depredación por parte de especies domésticas (perros).



COIPO

NUTRIA

Myocastor coypus

M *Koypu*

A -

Ha sido introducido en muchos países,
donde es una especie invasora.



¿Dónde habita?

Ambientes acuáticos
como lagos, lagunas, ríos, esteros y
humedales con presencia de totora
(*Schoenoplectus californicus*) y
otras especies similares.

¿Cuánto vive?

Alrededor de 6 años.

Reproducción

Construye refugios
subterráneos para criar.
Generalmente tiene 2
partos al año, de 5 crías
en promedio. El período de
gestación es de alrededor
de 132 días.

¿Qué come?

Se alimenta principal-
mente de gramíneas y
arbustos.


Es el roedor de mayor tamaño que habita en Chile



Posee una membrana natatoria
entre los dedos para nadar.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- Caza ilegal (su piel es usada en la confección de accesorios y su carne para la alimentación humana).




Aves

Son el grupo de vertebrados terrestres más diverso del mundo, caracterizados por tener una anatomía diseñada en torno al vuelo: las extremidades anteriores modificadas como alas, huesos ligeros y un sistema digestivo rápido y eficiente para procesar una dieta rica en energía. Son animales endotermos que regulan su propia temperatura

Plumas

Las alas están revestidas por plumas, quizá la característica más distintiva de las aves. Cumple variadas funciones como permitir el vuelo, mantener la temperatura corporal y exhibir tamaño y colores para el cortejo.

Existen diferentes tipos de plumas y tienen roles específicos:



Picos

Cada mandíbula está cubierta con una vaina queratinizada que da forma al pico. La forma de esta estructura depende del tipo de alimentación del ave.



Carnívora

Con forma de gancho permiten desgarrar la carne (ej: águila).



Nectívora

De forma delgada y alargada que permite alcanzar el néctar de las flores (ej: picaflor chico).



Herbívora

Picos gruesos y cónicos para poder romper semillas y plantas (ej: chicol).



Piscívora

Con forma de lanza que permite pescar a su presa acuática (ej: garza).



Omnívora

Con formas versátiles por ser una alimentación variada, por lo que generalmente son rectos y de tamaño intermedio (ej: tordo).



Filtradora

Poseen un sistema de filtrado que elimina el agua y minerales mientras obtienen su alimento (ej: pato cortacorrientes).

Visión

Los ojos de las aves son relativamente más grandes que otros vertebrados y casi inmóviles, lo que les exige girar la cabeza. Las aves diurnas tienen mayor agudeza visual, mientras que las nocturnas ven bien en la oscuridad. Un halcón ve 8 veces mejor que un humano y un búho 10 veces mejor en la oscuridad.

La posición de los ojos está relacionada con sus hábitos de vida. Algunos de ellos son:



Aves depredadoras:
ojos hacia adelante para distinguir mejor la profundidad.



Aves herbívoras:
ojos laterales que amplían la visión y evitan depredadores.

Patas

Las patas deben soportar el peso corporal, actuar como timón durante el vuelo, amortiguar el impacto del aterrizaje, ayudar a regular la temperatura corporal y limpiar y acicalar partes del cuerpo inaccesibles para el pico.



Rapaces:
con sus patas captura, inmoviliza e incluso en algunos casos asfixia a la presa. Poseen fuertes garras para cazar (ej: tucúquere).


Arborícolas:
necesitan dedos largos para poder sostenerse sobre las ramas de los árboles. (ej: rara).




Trepadoras:
necesitan dedos largos y uñas afiladas y fuertes para trepar por la corteza vertical de los árboles (ej: carpinterito).



Corredoras:
adaptadas para moverse en el suelo. Su garra trasera está reducida o ausente (ej: ñandú).



Acuáticas:
una membrana une los dedos, lo que les permite desplazarse en el agua (ej: pato correntino).



AGUILUCHO

VARIABLE HAWK, RED-BACKED HAWK

Geranoaetus polyosoma

M Ñamku

A -

¿Dónde habita?

Vive en zonas abiertas y bordes de bosques.



La hembra presenta coloración rojiza en espalda, el macho tiene la espalda completamente gris.

Reproducción

El nido está construido con ramas secas en cavidades de acantilados o en la copa de árboles. Pone 2 huevos que incuba por 35 a 36 días.

¿Qué come?

Se alimenta de mamíferos, especialmente roedores. En menor medida de aves, reptiles y caracoles.

¿Sabías que?

Existen al menos 27 patrones de color diferentes en el plumaje de esta especie.




⚠ Principales amenazas:

- Choque con ventanas de edificios.
- Hilo de volantín.



0,8 - 1 kg



RARA

RUFIOUS-TAILED PLANTCUTTER

Phytotoma rara

M *Kamtrü*

A



¿Dónde habita?

Frecuenta zonas limítrofes, desde bordes de bosques a jardines urbanos, matorrales, bosques y huertos, desde el nivel del mar hasta los 2.300 m de altitud.

¿Cuánto vive?

Menos de 10 años.

Reproducción

Postura de 2 a 4 huevos.



Tiene un pico con bordes aserrados que utilizan para comer frutas y hojas. ¡parecen dientes!



El macho tiene plumaje rojizo, la hembra un plumaje gris pardusco jaspeado.

¿Qué come?

Principalmente hojas, pastos y frutos silvestres. En menor medida consume insectos.

⚠ Principales amenazas:

- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Destrucción de nidos por cotorras argentinas.



44 g aprox



18 cm

LOICA

LONG-TAILED MEADOWLARK

Leistes loyca

M *Loika*

A -

Suele pasar mucho tiempo removiendo o escarbando el suelo en busca de su alimento.



¿Dónde habita?

Vive en áreas con pastizales, cultivos, matorrales, gramíneas y la estepa patagónica. Se alimenta en el suelo pero se posa sobre árboles, postes y arbustos.

¿Cuánto vive?

7 a 8 años.

Reproducción

Anida en el suelo, entre el pasto alto, donde incuba generalmente 3 huevos.

¿Qué come?

Se alimenta principalmente de semillas, brotes, bulbos subterráneos, arácnidos, insectos adultos y larvas, y excepcionalmente de vertebrados como lagartijas.



El macho tiene el pecho de un llamativo color rojo para atraer a la hembra

⚠ Principales amenazas:

- Atropellos
- Depredación por parte de especies domésticas(perros y gatos).



TUCÚQUERE

MAGELLANIC HORNED OWL

Bubo magellanicus

M *Toutou (búho)*

A *Juku (búho)*

¿Dónde habita?

Vive en ambientes diversos como montañas, matorrales, bosques, tierras de cultivo y la estepa patagónica.

¿Cuánto vive?

10 a 20 años.

Reproducción

Anida generalmente en cavidades y acantilados, poniendo entre 2 y 5 huevos.

¿Qué come?


Se alimenta principalmente de mamíferos, especialmente roedores. Ocasionalmente consume invertebrados.



⚠ Principales amenazas:

- Envenenamiento por consumo de ratones envenenados.
- Atropellos.

Es el búho más grande en Chile



0,75 a 1 kg

110 - 118 cm

CHERCÁN

SOUTHERN HOUSE WREN

Troglodytes aedon

M Chedüf, chedkeñ

A



¿Dónde habita?

Vive en ambientes diversos con la presencia de matorrales o arbustos donde refugiarse.

¿Cuánto vive?

El registro más longevo es de 9 años.

Reproducción

Anida en cavidades y grietas, poniendo entre 3 y 10 huevos y en promedio sobreviven 1 a 2 crías. El período de incubación es de 9 a 16 días. Cría a los pichones durante 16 días.



¿Qué come?

Se alimenta de una amplia variedad de insectos y arañas.

⚠ Principales amenazas:

- Ataque por gatos domésticos.



TORDO

AUSTRAL BLACKBIRD

Curaeus curaews

M Kürew

A -



¿Dónde habita?

Habita en bordes de bosques, zonas de matorrales, cultivos y jardines urbanos. Utiliza árboles o arbustos para posarse.

¿Cuánto vive?

Se estima que los Passeriformes, orden al que pertenece el tordo, tienen en promedio una longevidad máxima inferior a 10 años.

Tiene un canto muy melódico y aprende otras vocalizaciones con facilidad.

Reproducción

Pone entre 4 y 5 huevos en nidos que construye en la parte baja de los matorrales.

¿Qué come?

Consume principalmente insectos y en menor medida néctar de flores.

Se alimenta en el suelo, clavando el pico para abrir la superficie y así encontrar sus presas. También puede atraparlas en las ramas o la corteza.




Especie social

Vive en grandes bandadas que funcionan con "centinelas" que vigilan desde la altura de los árboles mientras el resto se alimenta en el suelo.

⚠ Principales amenazas:

- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Caídas de nidos.



CHINCOL

RUFIOUS-COLLARED SPARROW

Zonotrichia capensis

M *Meñkutoki*

A



¿Dónde habita?

Ocupa hábitats diversos, desde playas hasta laderas de montañas. También es abundante en sitios urbanos.

¿Cuánto vive?

Al menos 8 años en vida silvestre.

Reproducción

Sólo las hembras construyen el nido, que ubican en el suelo o sobre arbustos. La puesta promedio es de 2 huevos, el tiempo de incubación es de 11 a 12 días y generalmente sobrevive un solo polluelo, que permanece en el nido por 11 días aproximadamente.

¿Qué come?

Los adultos se alimentan principalmente de semillas de pastos y hierbas, mientras que los polluelos son alimentados principalmente con insectos.



¿Sabías que?

Su vocalización varía regionalmente. Se le conoce en Chile como tío Agustín, ya que el sonido de su vocalización pareciera decir ¿Has visto a mi tío Agustín?

⚠ Principales amenazas:

- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Caídas de nidos.
- Destrucción de nidos por cotorras argentinas.



CÓNDOR

ANDEAN CONDOR

Vultur gryphus

M Mañke

A Mallku, kunturi



El adulto posee un collar y las plumas cobertoras de las alas blancas. El juvenil es café.



¿Dónde habita?

Necesita áreas con riscos y acantilados, en general vive en zonas amplias con vegetación rala o de estepa.

¿Cuánto vive?

75 años en cautiverio y alrededor de 50 años en vida silvestre.

Reproducción

Pone un único huevo que es incubado por unos 60 días. El pichón permanece en el nido por unos 7 meses y luego mantiene su dependencia por cerca de 1 año. Las parejas monógamas ubican sus nidos en acantilados.

¿Qué come?

Es un ave carroñera (come animales muertos), sin embargo, en la zona central de Chile lo han visto alimentándose en basurales y rellenos sanitarios por falta de alimento.

Especie social

Es un ave social que se congrega con otros ejemplares en zonas de alimentación y dormitorios comunales llamados "condoreras".

Su pico curvado le permite desgarrar y cortar carne eficientemente.


Cuello sin plumas para evitar que parásitos de la carroña suban a su cuerpo.



Macho: cresta y ojos amarillos
Hembra: sin cresta y ojos rojos

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat, falta de alimento.
- La caza ilegal.
- Choques con el tendido eléctrico.
- El envenenamiento de carroña (para proteger el ganado de perros y otros depredadores).
- Ataques de perros.



ÁGUILA

BLACK-CHESTED BUZZARD-EAGLE

Geranoaetus melanoleucus

M Ñamku, Kallkiñ

A Paka

¿Dónde habita?

Habita en terrenos abiertos o montañosos, con vegetación baja y dispersa, utilizando postes, árboles altos o acantilados como posadero para buscar presas.

¿Cuánto vive?

Entre 18 y 30 años en cautiverio.

Reproducción

Pone 2 a 3 huevos blancos con pintas rojizas que incuba alrededor de 30 días.

Nidifica tanto en acantilados rocosos como en árboles altos, construyendo nidos que muchas veces reutiliza.

¿Qué come?


Ave rapaz que se alimenta de mamíferos, aves pequeñas, algunos reptiles y carroña.

Es capaz de tragarse en vuelo a las culebras y roedores pequeños.



⚠ Principales amenazas:

- La caza furtiva.
- En Chile central mueren ejemplares electrocutados por cables y torres de alta tensión.



TRICAHUE

BURROWING PARROT

Cyanoliseus patagonus

M *Trikawe*

A -

¿Dónde habita?

En la precordillera andina, en áreas abiertas dominadas por arbustos, hierbas y árboles, cerca de acantilados.

¿Cuánto vive?

Se han recapturado ejemplares de 8 años.

Especie social

Vive en grandes bandadas de hasta cientos de individuos, los que colaboran en la búsqueda de alimentos y protección contra depredadores.

Reproducción

Nidifica en colonias al borde de acantilados, donde excava madrigueras para poner sus huevos y criar a los polluelos. Pone entre 2 a 5 huevos y la incubación es de alrededor de 24 días.

¿Qué come?


Consume principalmente semillas. En menor medida, y según la estación del año y disponibilidad, come frutos, flores y hojas.



Los machos son ligeramente más grandes que las hembras (alrededor de un 5%)

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- Captura para su comercialización como mascota.
- Caza ilegal.
- Envenenamiento (los agricultores lo consideran una amenaza para sus cultivos).



El loro más grande y colorido que habita en Chile.



TIUQUE

CHIMANGO CARACARA

Milvago chimango

M *Trüwkü, cbiukü*

A

¿Dónde habita?

Vive en ambientes diversos, incluyendo ciudades, zonas de cultivos y áreas abiertas o semiabiertas.

¿Cuánto vive?

10 a 20 años.

Reproducción

La postura es de 2 a 3 huevos y el período de incubación es de 30 días, seguido por 35 días de crianza de los pichones en el nido. En general las parejas se reproducen solitariamente, pero pueden llegar a formar colonias densas.


¿Qué come?

Tiene una alimentación variada, que incluye roedores, aves, reptiles, insectos, lombrices, caracoles, carroña, frutos silvestres, granos de cereales y restos de comida que encuentra en basureros.



⚠ Principales amenazas:

- Ataques de perros y gatos.
- Caídas de nido.



SIETE COLORES

MANY-COLOURED RUSH-TYRANT

Tachuris rubrigastra

M Tray tray tromc

A -



¿Dónde habita?

Vive entre juncos y/o totoras en zonas de agua poco profundas de lagos, lagunas, tranques, vegas y esteros, entre otros.

¿Cuánto vive?


Alrededor de 6 años.

Reproducción

Construye un nido en la vegetación, a una distancia de entre 50 y 100 cm del nivel del agua, entrelazando principalmente juncos secos. La postura es de 2 a 3 huevos.

¿Qué come?

Principalmente insectos.



¿Sabías que?

A pesar de lo que indica su nombre, en su plumaje se pueden encontrar 8 a 9 colores distintos.



Los colores de la hembra son menos intensos.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat.
- Contaminación (afectando al hábitat y/o a la especie).



PIUQUÉN

ANDEAN GOOSE

Oressochen melanopterus

M *Piukeñ (ganso silvestre)*

A *Wallata (ganso andino)*



¿Dónde habita?

Principalmente en bofedales altoandinos. También lagunas, lagos y llanuras. En la zona central desciende a humedales del valle central en invierno.

¿Cuánto vive?

Se estima que los Anseriformes, orden al que pertenece el piuquén, tienen en promedio una longevidad máxima de entre 20 a 30 años.

Reproducción

Anida en cerros o acantilados cercanos a lagunas. El nido tiene forma de taza y lo cubre con plumas suaves. Pone entre 8 y 10 huevos y la incubación dura alrededor de 1 mes.

¿Qué come?

Se alimenta de pastos, juncos y plantas acuáticas.

Especie social

Viven la mayor parte del tiempo en bandadas de hasta 30 individuos.




El macho es más grande que la hembra.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat.
- Caza ilegal.



2,7 - 3,6 kg



75 - 80 cm

PATO CORTACORRIENTES

TORRENT DUCK

Merganetta armata

M

-

A

Pili, unkaylla (pato)

¿Dónde habita?

Necesita ríos torrentosos de agua fría con rocas que sobresalgan del agua para descansar.

¿Cuánto vive?

Los Anseriformes, orden al que pertenece el pato cortacorrientes, viven en promedio entre 20 a 30 años.

Reproducción

Nidifica en lugares altos a la orilla de ríos y pone 4 huevos que incuba exclusivamente la hembra por 43 a 44 días.

¿Qué come?


Se alimenta de invertebrados acuáticos, pequeños peces, plantas y algas.



Macho: colores blanco y negro.
Hembra: colores rojizos y gris.

⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación del hábitat. Ejemplos: actividad hidroeléctrica, erosión causada por la deforestación, disminución de los caudales por la explotación del agua, entre otras.
- Especies exóticas invasoras que compiten por alimento con la especie, como salmones y truchas.
- Contaminación.



GARZA CHICA

SNOWY EGRET

Egretta thula

M Waken (garza común)

A -



Las garzas vuelan con la cabeza pegada al cuerpo y el cuello recogido.



¿Dónde habita?

Necesita lugares con agua como ríos, lagos, lagunas, tranques, esteros y pantanos, en los que prefiere la orilla y zonas poco profundas.

¿Cuánto vive?

Se estima que los Pelecaniformes, orden al que pertenece la garza chica, viven entre 20 a 30 años.

Reproducción

Nidifica sobre árboles, riscos o en totorales, donde pone 3 a 5 huevos. En la época reproductiva, la coloración amarilla de la cara y las patas puede volverse anaranjada - rojiza.

¿Qué come?

Pequeños peces, anfibios, insectos, crustáceos y moluscos.


Especie social

Generalmente se la ve en pareja o formando bandadas numerosas.



⚠ Principales amenazas:

- Contaminación de los cursos de agua.
- Depredación por parte de especies domésticas (perros).



GALLINITA CIEGA

GREATER BAND-WINGED NIGHTJAR

Systellura longirostris

M

-

A

-

¿Dónde habita?

Utiliza diversos hábitats como oasis, zonas arbustivas andinas, matorrales, márgenes de bosques y zonas agrícolas.

Reproducción

Anida en el suelo, en zonas con poca vegetación y por lo general la postura es de 2 huevos.

¿Qué come?

Se alimenta de insectos que atrapa al vuelo.



El macho tiene bandas alares y de cola blancas, las cuales son pardas en la hembra.

¿Sabías que?

Poseen unas plumas en forma de bigote que ayudan a proteger los ojos y dirigir la presa hacia el pico.



⚠ Principales amenazas:

- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Atropellos.
- Se pierde en las ciudades por las luces que la encandilan.



QUELTEHUE

SOUTHERN LAPWING

Vanellus chilensis

M Tregüñ

A -



¿Dónde habita?

Habita en campos abiertos, parques urbanos, pastizales, zonas pantanosas y riberas de lagos y estuarios.

¿Cuánto vive?

Se ha estimado que las especies del orden Charadriiformes, al cual pertenece el queltehue, tienen en promedio una longevidad máxima de entre 10 a 20 años.

Reproducción

Nidifica en el suelo y la postura es de 3 a 4 huevos. Defiende activamente el nido y a las crías, emitiendo fuertes vocalizaciones y realizando vuelos direccionados para ahuyentar a los posibles depredadores.



Posee un par de espolones en sus alas que utiliza como método de defensa.

¿Qué come?


Se alimenta principalmente de insectos y, en menor medida, de semillas.

⚠ Principales amenazas:

- Depredación por parte de especies domésticas (perros y gatos).
- Atropellos.
- Hilo de volantín.



300 - 320 g



36 cm

HALCÓN PEREGRINO

PEREGRINE FALCON

Falco peregrinus

M Okori (halcón).

A Mamani (halcón).



¿Dónde habita?

Vive en praderas, bosques, acantilados y barrancos, aunque también en lugares con presencia humana y ciudades. Nidifica generalmente en riscos o acantilados de difícil acceso.

¿Cuánto vive?

17 años en vida silvestre y 25 años en cautiverio.

Reproducción

Pone generalmente 3 a 4 huevos y la incubación dura entre 28 y 29 días. Los polluelos permanecen en el nido por 6 semanas.

¿Qué come?

Se alimenta de diferentes especies de aves. Ocasionalmente consume roedores, murciélagos, reptiles e insectos.


¿Sabías que?

Posee una estrategia de caza característica: asciende a gran altura para buscar a su presa y se lanza a gran velocidad sobre ella, superando los 300 km/hr, razón por la cual prefiere zonas abiertas.



⚠ Principales amenazas:

- Pérdida y/o degradación de su hábitat.
- Choque con ventanas de edificios modernos.



JOTE DE CABEZA COLORADA

TURKEY VULTURE

Cathartes aura

M *Kelwi*

A *Siwiq'ara (buitre)*



Al volar, sus alas se mantienen inclinadas formando una "V"



¿Dónde habita?

Es un animal generalista, utilizando hábitats variados, desde el desierto hasta la estepa patagónica. Nidifica en cerros, dentro de cuevas, debajo de matorrales en quebradas o entre troncos caídos dentro del bosque.

¿Cuánto vive?

La longevidad máxima registrada en estado silvestre es de 16.8 años.

Reproducción

Generalmente la postura es de 2 huevos.

¿Qué come?

Es una especie carroñera que se alimenta de cadáveres de diferentes especies de animales.

¿Sabías que?

Es uno de los tres buitres de Chile, junto con el cóndor y el jote de cabeza negra.



⚠ Principales amenazas:

Alimentación en basurales por falta de alimento.



1,3 -2 kg



160 - 180 cm

Animales exóticos

Los animales exóticos son especies que no son nativas de un determinado ecosistema y su introducción puede tener un impacto negativo en la fauna nativa. En Chile, la presencia de estas especies puede alterar el equilibrio ecológico, compitiendo con los animales autóctonos por recursos como alimento y hábitat. Además, pueden transmitir enfermedades y depredar sobre especies locales, llevando a la disminución de su población e incluso a su extinción. Por ello, es importante gestionar adecuadamente la presencia de animales exóticos para proteger la biodiversidad nativa.

COTORRA ARGENTINA

MONK PARAKEET

Myiopsitta monachus

Distribución

Originaria del sudeste de Sudamérica.
Es exótica en el resto del continente americano, Europa y Asia.


Especie introducida en Chile en 1972, colonizando principalmente áreas urbanas en la zona norte, centro y centro sur del país. Se alimenta de semillas, frutos, flores e insectos.



Impacto

- Utiliza el hábitat disponible en los lugares que coloniza, desplazando a las especies nativas.

Se suele ver en grandes bandadas ruidosas y construye nidos comunitarios con cámaras interiores para parejas reproductivas.



Generalmente es posible observarla en grandes bandadas.

GORRIÓN

HOUSE SPARROW

Passer domesticus

Distribución

Originaria de Europa, Asia y el norte de África, pero actualmente se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial.

Especie introducida en Chile en 1904, colonizando prácticamente todo el país. Se alimenta de semillas e insectos.

Impacto

- Compete con diferentes especies nativas que habitan en zonas urbanas y posiblemente las desplaza al impedirles anidar, destruir sus huevos y/o atacar los polluelos.

PALOMA

ROCK PIGEON, ROCK DOVE

Columba livia

Distribución

Originaria del sur de Europa, Asia y el norte de África, pero actualmente se encuentra ampliamente distribuida a nivel mundial.

Especie introducida en Chile en 1928, colonizando prácticamente todo el país. Se alimenta de semillas, frutas e insectos pero en ciudades consume restos de alimentos procesados que caen al suelo.

Impacto

- Competencia con otras aves por espacio y alimento
- Transmisión de enfermedades a otras especies.



Existe una gran variedad de colores y patrones en el plumaje debido a la domesticación y reproducción selectiva. Puede formar bandadas de cientos de ejemplares.



PERRO

DOG

Canis familiaris

Distribución

Especie exótica cosmopolita que ha sido introducida en todo el mundo como acompañante del humano.

Esta especie fue introducida a Chile por los conquistadores españoles. En el país hay perros asilvestrados a lo largo de todo el país.

Los perros domésticos descienden de lobos europeos criados en cautiverio y domesticados. Cuando dejan de depender del ser humano para refugio y alimento, se llaman "perros asilvestrados". Estos forman grupos estables, recorren grandes áreas, evitan el contacto humano y cazan presas silvestres y ganado.

Impacto

- Depreda a variadas especies de fauna nativa como mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
- Compite y puede transmitir enfermedades a mamíferos nativos.

GATO

CAT

Felis silvestris catus

Distribución

Es originario del norte de África y la cuenca del Mediterráneo. Actualmente es una especie exótica cosmopolita que ha sido introducida en todo el mundo como acompañante del humano.

Esta especie fue introducida a Chile por los conquistadores españoles. En el país hay gatos asilvestrados a lo largo de todo el país.

Impacto

- Compite, depreda y puede transmitir diferentes enfermedades a la fauna nativa. Entre sus principales presas están aves, roedores, marsupiales y reptiles.
- Debido a su destreza en la caza, es especialmente perjudicial en islas donde sus potenciales presas no están acostumbradas a un depredador de este tipo.

